Phimosis

congénital. — accidentel soit par pierre en vessie, soit mal vénérien

inconvénients — séjour de l'urine — écoult. adhérences — véritable

rétention — coït diffic. — enfin paraphimosis. — ceux d'hors

Il faut donc une opération. il y a incision — excision — circoncision.

~~Rappeler~~ anatomie chirurg. — ~~sub retrait~~

Position. — l'essentiel c'est 1° d'empêcher le retrait 2°

d'empêcher les mains. — sur siège, genoux, lit. —

Incision — sur le dos outils variés, j'ai vu plusieurs bistouris.

méthode ordinaire — ses avantages — ses inconvénients —

Procédé J. Cloquet.

Cullerier ne coupe que la muqueuse

Cotter — incisions multiples. —

Malgaigne trois deux latérales, une inférieure.

avantages et inconvénients de cette méthode

Ricord dit de fixer le prépuce avec des pinces : mais l'ouverture ne laisse pas entrer autant de branches de pinces. —

Excision. l'incision ordinaire laisse des oreilles qu'on

est q. f.s obligé de retrancher.

Lisfranc. ciseaux courbes sur le plat, échancrures multiples sur la circonférence du prépuce

Bégin détache un lambeau de forme triangulaire, à base inférieure, à l'aide de deux coups de bistouri ou de ciseaux qui se réunissent sur le dos de la verge : ~~si la muqueuse déborde on l'excise à niveau de peau~~. La peau est tirée en arrière et la muqueuse coupée, sur la ligne médiane jusqu'à la base du gland,

circoncision. procédé des juifs. —
procédé de Ricord —
appréciation générale. — les méthodes qui laissent
le prépuce exposent à une infiltration, engorg.t chroniq. difformité;
celles qui enlèvent tout font une mutilation.
— je préférerais le lambeau et parmi la méthode ordinaire —
que s'il fallait tout ôter je ferais Ricord. ——

Pansement — ordinaire. —
on a conseillé la suture soit avec fils simples
soit avec épingles. hawkins coud ainsi la peau
à la muqueuse à l'aide de 4 à 5 points. ——
malgaigne l'a fait une fois. & il dit q. cela est très
douloureux et n'a pas réussi. —
Velpeau fait une suture en passant les anses de
fil d'abord mais j'avoue que je n'y ai rien compris.
durette je vise au même but avec mon pansement.

Paraphimosis

Procédé ordinaire de réduction. —

Procédé de Boyer, quand on ne peut réduire et qu'il
n'y a pas de péril en la demeure, l'étranglement n'étant
pas considérable on peut s'en tenir à la compression
avec une bandelette circulaire, et une bonne position.
Le malade doit : le bien venu et maintenant dans ce
cas.
— le débridement.

Restauration du [illegible] répace. —